Descripción de la especie

Familia : ARECACEAE (PALMACEAE)

Nombre común : PALMA COCO CUMBI

Nombre científico : PARAJOUBEA COCOIDES

A. 51





RAIZ: superficial y fibrosa

FORMA DE COPA	FOLLAJE	DIÁMETRO DE COPA	HOJAS	COLOR DE FLOR	FRUTOS	ALTURA DE ARBOL ADULTO	TASA DE CRECIMIENTO
							
PALMAR	LIGERO Follaje	3 - 5 m.	PINNADA	AMARILLO	RACIMOS - COLGANTES	15 - 20 metros.	REGULAR

DISTANCIA DE PLANTACIÓN: 5,00 - 8,00 metros

SITIOS APROPIADOS PARA LA PLANTACIÓN: Parterres formando alineaciones, redondeles, parques, en espacios abiertos formando pantallas.

USOS ESPECIALES: La sombra que proporciona es transparente y ligera. Es sumamente ornamental, Soporta muy bien los vientos fuertes.

REPRODUCCIÓN: Se reproduce por medio de semilla.

PRECAUCIONES: Puede desarrollarse en climas cálidos o templados, no soporta heladas frecuentes o prolongadas.
Prefiere los suelos ligeros, húmedos, bien drenados, así como la exposición a pleno sol.
La poda es innecesaria, pero la cubierta áspera puede removerse siempre y cuando no se dañe la salud del la palma.
La palma tendrá mejor apariencia si se deja que esta cubierta caiga por si misma.
Resiste bien la contaminación y el ataque de plagas.

REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Referencias: Técnicas de Manejo de la Arborización Urbana, "Sharon Murray". Fundación Natura.
Criterios para el manejo de la cobertura vegetal en los espacios públicos Distrito Metropolitano de Quito. EMOP-Q. Gerencia de Parques y Jardines.
Arquitectura del Paisaje, Fitografía, Manual de Reconocimiento de los Vegetales para Diseñadores, Vol 1, José Luis García Tavera, Clara Montero Alba.1986

Recomendación: Se recomiendoa mayor reproducción.

Descripción de la especie

Familia : ARECACEAE (PALMACEAE)

Nombre común : PALMA FENIX

Nombre científico : INESA COLENDA

A. 52



RAIZ: superficial y fibrosa

FORMA DE COPA	FOLLAJE	DIÁMETRO DE COPA	HOJAS	COLOR DE FLOR	FRUTOS	ALTURA DE ARBOL ADULTO	TASA DE CRECIMIENTO
							
PALMAR	DENSO Follaje	6 - 8 m.	PENIFORMES	ANARANJADO	OBLONGO - AMARILLO 2,5cm.	10 - 20 metros.	LENTO.

DISTANCIA DE PLANTACIÓN: 8,00 - 10,00 metros

SITIOS APROPIADOS PARA LA PLANTACIÓN: Parterres anchos, parques, espacios abiertos, zonas de protección ecológica.

USOS ESPECIALES: Para caracterizar accesos principales. Es la especie de palmera más cultivada en el país.

REPRODUCCIÓN: Se reproduce por medio de semilla.

PRECAUCIONES: Palmera bastante rústica y resistente, no tiene exigencias en cuanto a suelo, soporta la sequía
Resiste bajas temperaturas, prefiere climas templados, crece mejor a pleno sol.
Riego moderado, un exceso de agua puede acabar pudriendo la planta.
Plagas comunes: cochinillla en hojas, ataque de hongos (roya).
Necesita poda de Estípite, es decir limpieza de tallo y eliminar hojas secas, porque los roedores hacen sus nidos en ellas.

REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Referencias: Técnicas de Manejo de la Arborización Urbana, "Sharon Murray". Fundación Natura.
Criterios para el manejo de la cobertura vegetal en los espacios públicos Distrito Metropolitano de Quito. EMOP-Q. Gerencia de Parques y Jardines.
Árboles y Arbustos de Quito, Inés Padilla C.- Mercedes Asanza N. 200
Guía para la Utilización de la Vegetación en Áreas Urbanas, Instituto de Investigaciones de Ciencias Técnicas de la Universidad de Cuenca (I.I.C.T) 1991

Descripción de la especie

Familia : ARECACEAE

Nombre común : PALMA MOLINO DE VIENTO

Nombre científico : TRACHYCARPUS FORTUNEI

A. 53





RAIZ: superficial y fibrosa

FORMA DE COPA	FOLLAJE	DIÁMETRO DE COPA	HOJAS	COLOR DE FLOR	FRUTOS	ALTURA DE ARBOL ADULTO	TASA DE CRECIMIENTO
							
PALMAR	LIGERO Follaje	2,00 m.	PENACHO	CREMA.	GRIS-AZULADO	6 - 8 metros.	REGULAR.

DISTANCIA DE PLANTACIÓN:

SITIOS APROPIADOS PARA LA PLANTACIÓN: Parterres, redondeles, parques, zonas de protección ecológica.

USOS ESPECIALES: Especie ornamental, que resiste bien la contaminacvión.

REPRODUCCIÓN: Se reproduce por medio de semillas, tardando tres meses en germinar.

PRECAUCIONES: No se debe plantar cerca de construcciones. No es palmera adecuada para interiores.
Crece mejor en terrenos poco fértiles, siempre que no sean arcillosos o poco compactos.
Es la palmera que soporta mejor el frio.
Tolera bien el transplante
Necesita poda de mantenimiento, para eliminar las hojas secas.

REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Referencias: Técnicas de Manejo de la Arborización Urbana, "Sharon Murray". Fundación Natura.
Criterios para el manejo de la cobertura vegetal en los espacios públicos Distrito Metropolitano de Quito. EMOP-Q. Gerencia de Parques y Jardines.
EMOP-Q. Parques y Jardines, Área de Arborización
www. infojardín.com.